BIQUINOL, suppositoires adultes

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

· Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

· Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

· Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.

· Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

COMPOSITION
Succinate basique de bismuth ……50 mg
Quantité correspondante en bismuth ……37 mg
Cinéole (eucalyptol) ……45 mg
Gaïacol ……38 mg
Camphre synthétique ……30 mg
Excipients : glycérides hémi-synthétiques solides (Suppocire LB),
Pour un suppositoire de 2,7g
Boîte de 10 suppositoires.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
PRÉPARATION POUR LA GORGE (R : Système respiratoire].
MERCK Médication Familiale - 18C, Bd Winston Churchill - 21070 DIJON
Fabricant: SPPH - 5, impasse Champeau - 21801 QUETIGNY Cedex

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?
BIQUINOL ADULTES est préconisé en cas d'état congestif de l'oropharynx : maux de gorge, enrouements.
NB : devant l'apparition de fièvre, de frissons, d'altération de l'état générai, consultez votre médecin afin d'adapter votre traitement.

ATTENTION !
DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?
BIQUINOL ADULTES NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :
• insuffisance rénale
• lésion ou irritation récente de l'anus ou du rectum (contre-indication liée à la forme suppositoire).
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN OU DE VOTRE MÉDECIN.

MISES EN GARDE SPECIALES
BIQUINOL ADULTES contient des dérivés terpéniques qui ont pu entraîner à doses excessives des accidents neurologiques
à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant. Respectez les posologies et la durée de traitement préconisées (Cf. rubrique Posologie).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Consultez votre médecin en l'absence de guérison après 5 jours de traitement. En cas d'épilepsie ancienne ou récente,
DEMANDEZ CONSEIL A VOTRF, MÉDECIN.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN OU DE VOTRE MÉDECIN
NE JAMAIS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS
AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS; ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE PHARMACIEN OU A VOTRE MÉDECIN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT
II est préférable de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement, sauf avis contraire de votre
médecin. En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE
Voie rectale. RÉSERVÉ A L'ADULTE. 1 à 3 suppositoires par jour.

DUREE DU TRAITEMENT
Si les symptômes persistent au-delà de 5 jours, consultez votre médecin.

CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE
En cas d'intoxication accidentelle, [notamment fréquente chez les jeunes enfants), consultez immédiatement votre médecin,

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS
Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus
ou moins gênants :
• douleurs épigasfriques, nausées, vomissements, liés au gaïacol
• irritation locale liée à la forme suppositoire. En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non-respect des doses préconisées : possibilité d'agitation, de confusion chez les personnes âgées.
NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS ET À SIGNALEZ À VOTRE PHARMACIEN OU À VOTRE MÉDECIN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT
QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION : NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION INDIQUÉE EN CLAIR SUR L'EMBALLAGE.

DATE DE DERNIÈRE RÉVISION DE LA NOTICE : Septembre 2005